

# İŞTE DOĞA



□ Halk arasındaki adı Fare Balığı olduğu için yemeyen eti çok lezzetli (*Chimaera monstrosa*), yoğun bir tanıtma çabasıyla "Bal Balığı", veya Gümüş Balığı adı verilerek tüketilmesi özendirilmektedir. Eti oldukça lezzetli kimi yılanlar özellikle çingıraklı yılan tüketiciye sunulmadan önce balıklar hakkında kimi yerleşmiş kanıtlardan vazgeçilmesi Dünya'nın karşılaştığı açık tehlikesini giderebilir.



□ Nikobar güvercini (*Caloenas nicobarica*), kabukları taş gibi sert cevizleri bütün olarak yutar ve sindirmek için cevizlerini midesi içinde kiraplırlar.

□ Yağmur yılanı (*Oligocephalus caeruleus*) yumurtadıktan sonra, yumurtalar ilk büyülüklerinin iki katı kadar büyürler.



□ Artık, yaşamını Afrika Sahra çölünün güneyindeki dar bir bölgede sürdürmek zorunda kalan zürafa (*Giraffa camelopardalis*) 6 m. boyda 9-10 yaşlarında ulaşır. Doğa'da serbestçe dolaşan kimi erkek zürafaların (*Giraffa camelopardalis tippelskirchii*) 7 m. ye kadar boylandıkları söylenir.

□ Doğa'da "birarada yaşamak" veya "birlikte varolmak" ilkesinin uygulanması,ladın ağacında bulunan kuşların aşağıdaki durumları'a mümkün olmaktadır: 1) Sinek Kapan (*Ficedula albicollis*) dallarda durup bekler, gelen geçen sinek, kelebek v.s. avlar, 2) Ağaçkakan (*Picus viridis*) ağaç gövdesinde güçlü gagasıyla delikler açar, bulunduğu börek, tırtıl, böcek v.s. kaparak yer, 4) Çapraz Gaga (*Loxla curvirostrata*) tohumları ve kozalaklardan çıkardığı tohumları yer, 5)



Çalı kuşu (*Regulus regulus*) Avrupa'nın beş gramlık en küçük kuşudur. Çok ince uç dallara gidebildiği için buralardaki böcek ve sinekleri avlar, 6) Tırmışık kuşu (*Certhia familiaris*) gövde ve kalın dallar üzerinde koşar, çatlağ ve yarıklarda bulduğu larva, tırtıl ve böceklerle geçinir.

□ Demir akasyası (*Acacia peule*) Avustralya çöllerinin kalbinde ancak iki yerde yetişir. Odunu o kadar serttir ki yeriller savaştılarINI yapmak için bu ağaç kullanırlar.




□ Mavi añaçlı papağanı (*Amazona aestiva*) 90 yıl yaşabilimektedir.



□ Havlayan kurbağa (*Eleutherodactylus augusti*) Brezilya da yaşar. Üst göz kapakları boynuz gibi uzamıştır. İsrildiği bir at ile öldürülebilecek kadar zehirlidir.

□ Gerçek karabaşotu (*Holostachys caspia*) bir çöl bitkisidir. Kökleri, toprağın dışındaki gövde boyunun 15 katı uzunluktadır.



□ Kakum (*Mustela erminea*) ayen Gelinçik görünümündedir. Postu kışın bembeyaz yazın kestane renkli olur fakat kuyruğunu ucu her zaman siyah kalır.



□ Katil an (*Apis mellifera scutellata*) Afrika kökenlidir. Yapı ve görünüş yönünden Avrupa balarısından (*Apis mellifera*) hemen hemen farksızdır. Uzmanlar bile ancak saldırgan davranışlarından ve uzun zaman isteyen gözlemlere dayanarak katil anı tanıırlar. İğnelerini balarısı gibi 4 değil 8 kez kullanabilirler. 5-6000 katil an, bir tavşanı bir dakikada öldürürler. Balarısından çok hızlı ve daha uzak mesafelere ulaşabilirler. Larvalarına yedirdikleri için alınacak bal miktarı az olur. Balarısından daha sık oğul verdikleri için hızla çoğalarlar. 1956 yılında Afrika'dan balarısı ile çaprazlanmak Üzere Brezilya'ya getirilen katil anları kovanlarından kaçırılmışıyla korku veren yayılmaları başlamıştır.



□ Goveşka (*Percottus glehnii*) 24 cm ye kadar boyanan bir balıktır. Böcek larvalarıyla beslenmesi, özellikle sıvısların larvalarına düşkünlüğü sitmanının kökünden kazınmasına etkili olabilir. Oksijeni az ve 15-20 derecelik sularda yaşayabileceğini öneleyen artırmaktadır.



□ Aslinda kanatları açık renk ve üzerinde rasgele dağılmış siyah benekleri bulunan Huş Büyücü Kelebeği (*Biston betularia*) gündüzleri açık renk zeminde konar. Bu durumu doyayıyla kolay fark edilemez ve düşmanlarından korunmuş olur. 19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de sanayinin gelişmesi çevreleyen büyük ölçüde kırlett ve bu arada ağaçlar da siyahaya yakın koyu renkli bir görünüm aldılar. Çevredeki bu değişiklik, Huş Büyücü'yü de adeta boyayıp koyulaştırdı. Çünkü doğal düşmanlarından ancak böyle bir mutasyonla korunabiliyor oldu.




□ Ay faresi (*Gymnura gymnura*) kendini korumak için keskin soğan kokusu çıkararak düşmanlarını kaçırır.



□ Para ile değer biçilen en kıymetli hayvanlar yarış atlardır. Bunlardan birinin 1980 yılı fiyati 30 milyon dolar olarak saptanmıştır. Yarıştırılarak üzerlerinden para kazanılan hayvanlar dışında sadece ziyaretçilere gösterilmek için kullanılan Dev Panda (*Ailuropoda melanoleuca*) yavrusu için 1.5 milyon dolar değer biçilmiştir.



□ Baba süpürücü (*Chaetura pelasgica*) kanatlarını aynı zamanda değil, birbirini bir öteklini sıra ile çırpan tek kuştur.



□ Yakın zamanda mini yarasanın bulunusuna kadar Cüce Soreks (*Etrusk-sivriburun* faresi, *Sorex minitus*) dünyanın en küçük memeli olarak bilinirdi. En büyük memeli ise Mavi ballinadır. (*Balaenoptera musculus*). Büyüklükleri orantılı olarak çizilen at (*Equus caballus*) ayağı ile Soreks ve at ile mavi ballina karşılaşılırken, Soreks at nalının bir çivisi ve at ballina göğüs yüzgeç büyüküğündedir.



□ Çin siğircığı (*Acridotheres tristis*) serbest yaşamında son derece saldırgan bir kuştur. Bu sebeple bir zamanlar Amerika'ya ithal yasaklanmıştır. Fakat son günlerde yapılan araştırmalar onun da papağanlar gibi kelimeleri öğrenebildiğini hatta anımlı cümleler kurabilidğini göstermektedir.

Hazırlayan ve Resimleyen:  
Erdoğan SAKMAN